



# RESPUESTA A LA UTILIZACIÓN DE MIFEPRISTONA



Rodríguez Armario, Eva

- La mifepristona es un fármaco con acción antiprogestágena conocido como la píldora abortiva, comercializado en sólo 13 países

- **Sus indicaciones oficiales son:**

- 1) Abortivo en dosis de 600 mg + 400 µg de misoprostol oral/vaginal en gestaciones de hasta 7 semanas
- 2) Preparador cervical: 200 mg de 36-48 h. antes aborto quirúrgico
- 3) Preparador (200 mg) de la acción de las prostaglandinas en 2º trimestre



## MISOPROSTOL

- Es un análogo sintético de las PG1, comercializado en más de 80 países
- Estable a temperatura ambiente
- Ligeramente broncodilatador y de fácil administración:  
oral, vaginal, sublingual, etc.

Mínimos efectos secundarios por vía vaginal y muy económico.

Este fármaco está disminuyendo considerablemente la morbi-mortalidad por aborto en los países en donde el acceso al aborto está muy limitado, sobre todo en América Latina y África.

Su uso en España en esta indicación está muy extendido. Las clínicas acreditadas para el aborto lo usamos como abortivo y dilatador cervical.





**El uso de la Mifepristona en España es muy irregular.**


**En Andalucía es muy escaso. De las 16 clínicas sólo 7 la ofertan y en 6 es más cara que el quirúrgico, en dos mucho más cara**

**En el congreso de la SEC en Valencia se comunicaron 3.642 casos hechos en España desde su comercialización (aprox. 2 años)**






TÉCNICA	
Quirúrgico	96,19
Ru	3,81






EDAD	RU	QUIRÚRGICO
Menor de 18 años	1,69	5,83
De 18 a 24 años	40,68	35,10
De 25 a 29 años	28,81	21,19
De 30 a 34 años	18,64	18,01
Mayor de 35 años	10,17	19,87




MEDIA DE EDAD	
Media de edad Quirúrgico	26 Años
Media de edad Ru	24 Años






Nº DE I.V.E	
Sin I.V.E Previa	52,54
I.V.E.s Previas	47,46




Nº DE HIJOS	
Ningún Hijo	72,88
Un Hijo	11,86
Dos Hijos	11,86
Más de 2 Hijos	3,39

Nº DE HIJOS




# RESPUESTA A LA UTILIZACIÓN DE MIFEPRISTONA




- Éxito 86.44
- Fracaso 13.56

ÉXITO	
Aborto Completo Con Mifepristona	4,17
Aborto Completo Con 1ª Dosis Misoprostol	89,58
Aborto Completo Con 2ª Dosis Misoprostol	6,25



- Aborto Completo Con Mifepristona
- Aborto Completo Con 1ª Dosis Misoprostol
- Aborto Completo Con 2ª Dosis Misoprostol

FRACASO	
Fracaso por Sangrado Excesivo	25,00
Fracaso por No Expulsión	62,50
Solicitud de la Mujer Quirúrgico	12,50



- Fracaso por Sangrado Excesivo
- Fracaso por No Expulsión
- Solicitud de la Mujer Quirúrgico





	Efectos secundarios de la Mifepristona		Efectos secundarios del Misoprostol	
	Dolor	Sangrado	Dolor	Sangrado
Dolor/Sangrado no consta	89,80	79,59	67,35	51,02
Dolor/Sangrado 1	16,33	10,20	10,20	8,16
Dolor/Sangrado 2	14,29	20,41	28,57	30,61
Dolor/Sangrado 3	0,00	10,20	14,29	30,61

	Efectos secundarios de la Mifepristona	Efectos secundarios del Misoprostol
	Vómitos	Vómitos
Sí	10,17	11,86
No	89,83	88,14

	Grado de Satisfacción	
Muy Bueno	18,18	
Bueno	63,64	81,82
Malo	9,09	
Muy Malo	9,09	18,18



El método **quirúrgico** requiere una sola visita de 1 a 2 horas y es eficaz en un casi 100%, es poco doloroso. Postoperatorio satisfactorio.

El **farmacológico** requiere al menos tres consultas (por lo menos en la mayoría de las clínicas es así), parece ser algo más doloroso, el sangrado suele ser mayor y se producen otros efectos secundarios como náuseas, vómitos, fiebre etc.

**Posibilidad de elegir**

**Pero para ello es necesario disponer de información veraz**

